

RVPS L. Mikuláš informuje chovateľov hydiny a vtákov o nepriaznivej nákazovej situácii, čo sa týka vtácej chrípky.

V SR boli do dnešného dňa potvrdené ohniská vtácej chrípky v okresoch Trnava, Galanta a 2x v okrese Tvrdošín.

Jednalo sa o voľne žijúce vtáky ako aj vtáky chované v zajatí vrátane hydiny.

Chovatelia majú zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť chovov vtákov a hydiny.

1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým:

a. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),

b. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi); ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,

c. voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,

d. pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce (predovšetkým sťahovavé vodné) vtáctvo (tj. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,

e. **oznamovať na RVPS Liptovský Mikuláš (tel. 044/5523814, 0904131041) akékoľvek príznaky vtácej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:**

- pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
- akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.